

鳃裂囊肿_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_B3_83_E8_A3_82_E5_9B_8A_E8_c22_610045.htm 由胚胎鳃裂残余组织所形成，源于第二鳃裂者多见。囊肿和瘘管壁内衬复层鳞状或柱状上皮，含有淋巴结样组织。鳃裂囊肿尚可发生癌变。

【诊断】1. 本病多见于青少年。2. 囊肿常位于舌骨平面、胸锁乳突肌上1/3深面和前缘。表面光滑质软、有波动感。穿刺可得棕黄色液体，可查见胆固醇结晶。平时无症状，生长缓慢，感冒时可骤然增大，并发感染时则有肿、痛等表现。鳃裂瘘外口多见于胸锁乳突肌前缘中下1/3处，分泌物似粘液样，内口在咽侧，造影检查有助诊断。【治疗】手术彻底切除囊肿和瘘管。由于病损与颈部重要结构关系密切，术中应注意保护。术前可注射1%亚甲蓝于囊肿或瘘管内，以便引导手术进行。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com