

面裂囊肿_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_9D_A2_E8_A3_82_E5_9B_8A_E8_c22_610049.htm 面隙囊肿是由面突融合线内的上皮残余所发生，亦称非牙源性外胚叶上皮囊肿。

【诊断】多见于青少年。无特殊体征，诊断主要依据病变特定部位和ɪmp;#x2013;线检查。

1. 鼻腭囊肿 来自鼻腭管内残留上皮，位于切牙管内者为切牙管囊肿；位于管口软组织内者叫腭乳头囊肿。可表现为腭中缝前肿胀，间有疼痛和溢液。x线片显示切牙管扩大，呈椭圆形透光阴影，中切牙牙根可有移位。
2. 正中囊肿 上腭正中囊肿位于切牙孔后腭中缝处。无自觉症状，局部稍隆起，x线片可见圆形透光区，边界清楚。
3. 球上颌囊肿 位于上颌侧切牙和尖牙之间，尖牙凹可有膨隆，牙可移位。x线片见牙根间有透光阴影。似倒立梨形，注意与根尖囊肿鉴别。
4. 鼻牙槽囊肿 又称鼻唇囊肿，位于上唇基底和鼻前庭处软组织内，与骨质无关，增大时可引起鼻唇部变形。

【治疗】手术摘除囊肿。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com