

牙龈瘤_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_89_99_E9_BE_88_E7_98_A4__c22_610051.htm

牙龈瘤乃起源于牙周膜和牙槽骨骨膜的炎性或反应性增生物。【诊断】1. 表现多见于中青年，女性多于男性。好发于前牙和前磨牙的唇颊侧，从牙间乳头处突出，呈扁圆形，有时呈分叶状，一般如蚕豆大。有的有蒂呈息肉状，有的基底宽广。可引起牙松动、移位。2. 分型 肉芽性牙龈瘤。呈红色，柔软易出血。纤维性牙龈瘤。呈粉红色，质较硬，不易出血。妊娠性牙龈瘤。呈紫色，柔软，易出血。巨细胞牙龈瘤。呈蓝紫色，柔软，易出血。【治疗】手术切除，要求彻底，应连同波及的牙、牙周膜、骨膜及牙槽突一并切除以防复发。但妊娠性牙龈瘤，应观察到分娩后再行处理。

血管瘤血管瘤为常见的良性肿瘤，起源于残余的胚胎成血管细胞。【诊断】1. 多数患者在出生时或生后不久即可发现。2. 临床可分为毛细血管瘤、海绵状血管瘤和蔓状血管瘤等三型，以前两型多见。3. 毛细血管瘤呈鲜红或紫红色，压之褪色，与皮肤平齐，称葡萄酒色斑型血管瘤。隆起者称草莓型血管瘤。4. 海绵状血管瘤呈蓝色或紫蓝色，表面不平，柔软，有压缩性，体位移动试验阳性，可扪及静脉石，穿刺抽吸出血液。5. 蔓状血管瘤常侵及皮肤和深层组织，可破坏颅骨外板，与颅内静脉窦相通。局部呈隆起状，皮下血管粗大弯曲呈蚯蚓状，有搏动感，听诊闻及吹风样杂音，局部皮肤温度较高。6. 瘤腔造影、动脉造影、数字减影血管造影或ct检查，可了解血管瘤的范围和侧支循环情况。【治疗】1. 手术治疗用于局限的血

血管瘤，范围较广者，可行部分或大部切除，术中可用微波热凝。2．放射治疗 婴幼儿毛细血管瘤和表浅的海绵状血管瘤，可采用核素或镭针治疗。3．硬化治疗 用于海绵状血管瘤。常用5%鱼肝油酸钠作瘤腔内注射。口底和舌部血管瘤，宜在肿瘤边缘及瘤内分多点注射。4．冷冻治疗用于草莓型和海绵状血管瘤。5．激光治疗用于表浅的血管瘤。6．激素治疗 生长迅速的婴幼儿血管瘤，可用大剂量短疗程糖皮质激素。间日口服泼尼松(5mg/kg)，1个月为1个疗程。7．血管内栓塞疗法用于蔓状血管瘤和巨型海绵状血管瘤。8．博来霉素治疗 瘤腔内注射。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com