

颌骨中心性癌_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_A2_8C_E9_AA_A8_E4_B8_AD_E5_c22_610072.htm 颌骨癌颌骨癌可由口腔癌扩展而来。颌骨内部发生的癌称为中心性颌骨癌，主要发源于残存的牙胚细胞，常在骨内较长时间不被发现。肿瘤自骨髓内向骨皮质侵犯，穿破骨皮质后，则波及周围软组织而出现肿块。肿瘤也可沿下牙槽神经管扩展，甚至穿出下颌孔进入翼颌间隙。晚期可侵犯皮肤，转移至颌下淋巴结、颈深上淋巴结。少数有血行转移。【诊断】1.早期无自觉症状和外形改变，诊断常较困难。后期可有下唇麻木、牙痛、牙松动、脱落。肿瘤也可自牙槽窝内长出或穿破骨皮质，晚期可溃破。2.x线、ct检查，为诊断中心性颌骨癌的重要方法。早期病损局限于根尖区，呈不规则虫蚀状破坏。后期可见骨皮质破坏。3.病理检查可确诊，较早期可拔除一个松动牙，自牙槽窝内刮取瘤组织病检。如已穿破骨皮质形成肿块，则病理检查较易进行。【治疗】1.手术切除是治疗中心性颌骨癌的主要方法。根据癌的侵蚀范围，可做部分下颌骨、半侧下颌骨或包括对侧下颌骨的广泛切除。2.中心性颌骨癌一般行选择性颈淋巴清扫术，如颌下、颈下或颈部有淋巴结转移，可在切除原发灶的同时，做全颈淋巴结联合根治切除术。3.上颌骨中心性癌的治疗，可参照上颌窦癌和根据病变的范围，行部分或全上颌骨切除。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com