

乳头状囊腺瘤\_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B9\\_B3\\_E5\\_A4\\_B4\\_E7\\_8A\\_B6\\_E5\\_c22\\_610088.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E4_B9_B3_E5_A4_B4_E7_8A_B6_E5_c22_610088.htm) 乳头状囊腺瘤

(papillary cystadenoma) 是涎腺上皮性良性肿瘤。【治疗措施】乳头状囊腺瘤应采用手术治疗。手术切除肿瘤及其周围正常组织，而不应做单纯肿瘤摘除。【病理改变】1.大体形态 肿瘤呈圆形，直径以1~3cm者最多，表面呈结节状，与周围组织界限清楚。剖面呈白色或灰白色，实性或含有大小不等的囊腔，囊腔内含有粘液样物质，较大的囊腔内可见细小乳头突入。2.镜检 肿瘤由粘液细胞和立方细胞构成。两种细胞交错排列。粘液细胞呈柱状或立方状，核圆形，位于细胞一端，体积较小，染色深，胞浆染色浅。立方细胞胞浆嗜酸性，界限不清，核呈圆形或椭圆形，体积较大，染色浅。在乳头状囊腺瘤内腺腔极度扩大成囊腔，囊腔由柱状或立方状腺上皮细胞衬里，腔内有很多增殖的乳头突入。乳头的上皮细胞为高柱状，有分泌现象，乳头中央有结缔组织纤维束，无淋巴样组织。囊腔内含有嗜酸性物质。3.生物学特点 对乳头状囊腺瘤的性质目前认识尚不一致，大多数人认为属良性肿瘤，但具有局部侵袭性。【临床表现】涎腺乳头状囊腺瘤好发生于小涎腺，其中以腮部多见。患者的性别分布无差别，发病年龄以30~50岁最多见。患者表现为局部肿块，生长缓慢，病程较长，有的可长达数十年。大多数患者无自觉症状以及功能障碍，少数患者可出现疼痛或胀感。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)