

真性颞下颌关节强直_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_9C_9F_E6_80_A7_E9_A2_9E_E4_c22_610094.htm

由于关节内感染、外伤造成关节结构改变而致张口受限，甚至完全不能张口，导致下颌骨发育异常。【诊断】1.关节或关节周围外伤史。2.张口困难，甚至不能张口。3.下面部发育畸形，下颌短小，后缩，呈鸟嘴状。4.咬合关系紊乱，下前牙呈扇形伸展。5.下颌骨角前切迹加深。6.患侧髁状突活动度减弱或消失。7.x线摄片可见关节间隙模糊或消失，关节结构不清，呈团块状阴影。严重时乙状切迹间隙消失。【治疗】1.髁状突切除术用于关节的骨性和纤维性强直。2.颞下颌关节成形术 根据骨痂形成的范围，可选用高位截骨术、中位截骨术和低位截骨术，其中以高位截骨术较常用。在截骨后的间隙内可植入筋膜、硅橡胶帽或钛片等。截骨后在升支部植骨或植入代用品，可选用喙状突、升支后缘*形植骨，或钛人工关节头等植入材料。3.伴有小颌畸形者可在关节成型术同时进行颌骨正畸。特别对伴有睡眠呼吸暂停综合征者，更属重要。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com