

输尿管囊肿_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_BE_93_E5_B0_BF_E7_AE_A1_E5_c22_610156.htm 是一种先天性发育异常。可分为：一、单纯性，为单侧或双侧。二、脱垂性，女性可脱垂至尿道口，男性至后尿道。三、异位输尿管囊肿位于尿道内或膀胱颈。【诊断】一、症状（一）尿路感染：脓尿、发热、尿频、血尿、排尿困难、尿痛等表现。（二）尿路梗阻：反复尿阻滞，严重可引起呕吐、便秘、贫血、头痛、体重减轻等慢性尿毒症现象。二、体格检查：由尿道外口脱垂时，可见一球状物，表面有充血的小血管。有时可见输尿管开口。三、膀胱镜检查：可见囊肿有节律性收缩或充盈。四、排泄性尿路造影：检查两侧肾功能，有无肾积水及患侧输尿管有无过渡迂曲及扩张。膀胱内有一球形充盈缺损。【治疗】一、经内腔镜作囊肿切开或作切除及抗返流的输尿管膀胱再吻合术。二、肾功能已严重破坏时，切除患肾及全部输尿管。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com