

小阴茎_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_B0_8F_E9_98_B4_E8_8C_8E__c22_610160.htm 小阴茎是一种较普通的先天性异常，阴茎长度比同龄人小2个标准差（cm），称为小阴茎。【治疗措施】近几年，小阴茎治疗方法有一定改进。但是，雄激素的替代仍然是主要的治疗方法。由于给患者体内提供了足够的睾酮，将刺激阴茎的发育，并不影响骨骼的生长和闭合。aller推荐的治疗方案为每3周口服睾酮25mg，总量不超过100mg。应通过治疗前、后的阴茎长度测量（耻骨至龟头）评价治疗效果。应从一岁开始治疗。目的是使患儿生殖器官发育与身体增长保持一致。如患儿阴茎生长比较同龄儿童差，应重复上述治疗。对伴有睾丸下降不全的患儿，应在2岁前行睾丸下降固定术。亦可应用lhrh，促进阴茎的发育和睾丸下降。【病因学】病因：小阴茎与体内睾丸酮缺乏有关，睾丸酮缺乏是激素靶器官发育不良的结果。常伴有睾丸发育差，下降不全。另外一些器官发育（包括阴囊）也可受累。下丘脑分泌的黄体生成素释放激素（lhrh）减少。由于垂体性腺轴未受影响，以睾丸酮治疗仍有一定效果，但是，其作用可能是微弱的。如局部应用5%睾丸酮乳膏将有助于阴茎增大，其作用是局部激素的吸收，尔后通过全身性促进生殖系统的发育。【临床表现】外生殖器尤其阴茎较小，可无阴囊，或不能摸到睾丸，前列腺亦特小。【鉴别诊断】小阴茎应与隐匿阴茎区别。应排除其他内分泌和中枢神经系统的异常。骨骼的延迟生长，嗅觉缺失，学习能力低下，促肾上腺皮质激素（acth）和促甲状腺激素（tsh）的缺乏，都与小

阴茎有关。性功能的情况也应该详细询问。100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com