

阴囊炎性癌\_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E9\\_98\\_B4\\_E5\\_9B\\_8A\\_E7\\_82\\_8E\\_E6\\_c22\\_610175.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_98_B4_E5_9B_8A_E7_82_8E_E6_c22_610175.htm) 阴囊湿疹样癌又称佩吉特(paget)病或阴囊炎性癌，多在50~60岁后发病，系老年性恶性癌肿。【诊断】一、临床表现（一）初期为阴囊部位的小水疱状皮疹，多因搔抓溃破后渗液使病变逐渐扩大，累及阴茎根部。（二）数月后形成慢性炎性硬结，肿块周围与正常皮肤有分界，可出现瘙痒、糜烂、渗液、结痂等湿疹样损害。（三）一侧或两侧腹股沟淋巴结可扪及肿大。二、检查对久治不愈的皮损，尽早做活检。【治疗】一、早期手术切除，要求深达表皮层，真皮层和睾丸鞘膜，切除范围包括肿瘤外2cm正常皮肤。二、若腹股沟淋巴结阴性，可不作腹股沟淋巴结清扫术，若淋巴结阳性，应做睾丸，精索及腹股沟淋巴结在内的广泛切除。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)