

输尿管口异位_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_BE_93_E5_B0_BF_E7_AE_A1_E5_c22_610194.htm 多见于有重复肾，重复输尿管畸形的病例，少数没有重复肾，重复输尿管的亦可发生开口异位。男性可在后尿道、精囊、射精管处开口，由于有尿道外括约肌控制，无尿失禁现象。女性多开口于前庭、尿道、阴道或子宫，都有尿失禁现象。【诊断】一、症状（一）女性出生后除正常排尿外，同时有不自自主滴尿。（二）男性不自自主滴尿，但可有反复尿路感染，如脓尿及腰部疼痛。（三）开口在直肠内，易出现尿路上行性感染；大便常稀薄。（四）尿道口滴尿者要与尿失禁鉴别。二、x线检查（一）排泄性尿路造影时，如发现有重复肾或重复输尿管，则有异位开口的可能。（二）对女性，静脉注射靛胭脂后耐心观察阴道前庭或尿道口等处有无蓝色液溢出；发现异位开口时，插入导管作逆行性造影，可证实异位开口。三、膀胱镜检查：可能有双侧输尿管开口正常，一侧开口消失或二侧均不正常。【治疗】一、有重复肾、重复输尿管上肾的输尿管异位开口，其肾功能不良或有合并感染者，可将异位开口的输尿管连同连接该输尿管的重复肾全部切除。二、没有重复肾的异位开口，可将该输尿管分出重新移植至膀胱。重复肾、上肾输尿管异位开口，上肾功能尚好者，也可将输尿管重新移植于膀胱。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com