

阴茎硬结症_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_98_B4_E8_8C_8E_E7_A1_AC_E7_c22_610223.htm 阴茎硬结症

(peyronie病)最早报道在1742年，常在中老年男性中发病。

【治疗措施】目前，此症还没有满意治疗方法，但有50%患者能自然缓解，可给予对位氨基苯甲酸和维生素e口服几个月，但药物治疗效果是有限的。近几年，对一些顽固性患者可行手术切除硬结，而后行皮肤移植。das(1980年)报道硬结切除后应用睾丸鞘膜移植成功。bruskewitz和raz(1980年)报道硬结切除后在阴茎海绵体内植入阴茎假体。另外还可行放疗，局部注射类固醇药物，二甲基硫氧化物(dmsO)和甲状旁腺素，这些治疗效果报道的资料不多。【病理改变】尽管目前对peyronie疾病的认识还不清楚，但病理变化与严重的血管炎是一致的，此症与dupuyter氏手掌肌腱挛缩的病理变化相似。【临床表现】临床症状与体征：勃起时，阴茎弯曲，并有疼痛，阴茎硬结处远端勃起不坚，严重畸形影响性交。阴茎疲软时，无疼痛。检查阴茎体部可触及局限于阴茎海绵体白膜的、不同大小的纤维性硬结或索状硬块，无压痛，硬结常好发于阴茎体部的远端。有此病人，可触及多个硬结，严重的病人在x光摄片可见钙化和骨化。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com