

隐睾_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_9A_90_E7_9D_BE__E6_B3_8C_c22_610232.htm 【诊断】

一、阴囊的一例或两侧发育不全，阴囊内睾丸缺如。二、腹股沟部可触及睾丸，并见局部隆起。如睾丸停留在腹膜后，则不能触及。

【治疗】一、手术治疗：应在2周岁前施行。否则有可能使生精功能丧失或难于避免恶变。作睾丸固定术，成功关键在于游离睾丸，分离精索使其达到足够的长度，注意修复并存的腹股沟斜疝。如高位隐睾呈萎缩状态，应考虑作睾丸切除。腹内型隐睾可经腹腔探查。

二、内分泌治疗：出生后一周岁睾丸不下降者，尤以双侧者可试行激素治疗。(一)绒毛膜促性腺激素(hcg)：5000u肌注，隔日一次，总量不超过15000u。

(二)促性腺素释放激素(gnrh)，亦称黄体生成素释放激素(lhrh)：400ug喷鼻，每日三次，四周为一疗程，显效为52%。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com