

附睾炎_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_99_84_E7_9D_BE_E7_82_8E__c22_610237.htm

多见于中青年，常由前列腺炎、精囊炎进行感染所致，血行感染者少见。本病是常见的男性生殖系统疾病之一。附睾炎多由邻近器官感染蔓延所致。表现为阴囊部位突然性疼痛，附睾肿胀，触痛明显，可伴有发热，附睾硬结等。急性附睾炎多继发于尿道、前列腺或精囊感染，慢性附睾炎常由急性期治疗不彻底而引起。

【诊断】急性附睾炎1.症状 全身不适，发冷发热，阴囊肿痛、坠胀，并向腹股沟及下腹部放射。2.检查 阴囊红肿，附睾肿大可波及睾丸，触痛明显，肿胀严重或附睾及睾丸均肿大则二者难以区分。同侧精索增粗、硬韧，并有触痛。抬高阴囊坠痛可减轻。查血白细胞计数增加。慢性附睾炎1.阴囊坠胀、不适或有坠痛。2.附睾常呈均匀肿大，中等硬度，有轻压痛，但不与皮肤粘连。输精管也可增粗但无串珠样改变。

【治疗措施】急性附睾炎急性期应卧床休息，托起阴囊，给予抗生素、镇痛剂、作理疗。形成脓肿需切开引流。慢性附睾炎对症治疗，包括支持阴囊，局部理疗，精索封闭。屡发的慢性附睾炎、症状顽固者可考虑附睾切除。1、应注意生活规律，劳逸结合，忌辛辣刺激、杜绝酒吸烟。2、避免长时间坐位。3、避免房事过多。4、保持大便通畅。5、温水坐浴或局部热敷，每次20分钟左右。6、合理应用抗生素。【临床表现】本病属于中医子痈范围，临床表现为突然发病，阴囊内疼痛、坠胀、并伴有发热、恶寒等全身感染症状，疼痛可放射至腹股沟，下腹部及会阴部。100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com