

无痛性甲状腺炎_内分泌科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_97_A0_E7_97_9B_E6_80_A7_E7_c22_610268.htm 【诊断】1.临床表现轻中度的甲状腺功能亢进症状，甲状腺不肿大或轻度肿大，质地稍硬，无结节，无血管杂音。2.血清t₃,t₄ ft₃大多增高，也可正常，ft₄多增高，fsh均减低。甲状腺核素显像摄99锝延迟，甲状腺摄取率均低于正常。tga，tma可正常或中轻度升高，tr-ab阴性。尿24h碘排泄增高。3.甲状腺无疼痛，病人无发热，血沉不快，白细胞计数不高，但临床经过与亚急性甲状腺炎相似，即表现为甲状腺毒症期（2~5个月），正常甲状腺素血症期（数周），低甲状腺素血症期（1~6个月）及恢复期等4个阶段。【检查】1.血沉，血糖，血脂。2.24h尿碘测定。3.血t₃, t₄, ft₃，ft₄,tga,tma, rt₃,tsh,tr-ab测定。4.甲状腺99锝显像，甲状腺¹³¹碘摄取率测定。5.胸部x线片，心电图，腹部a型超声检查。6.必要时行fnab或甲状腺粗针活检。【治疗】无痛性甲状腺炎是自限性疾病，仅用β-受体阻滞剂普萘洛尔（心得安）10mg,2~3/d，即可改善症状，抗甲状腺药物及糖皮质激素不是应用指征，手术和放射性碘治疗属禁忌。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com