

脓疱疮\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E8\\_84\\_93\\_E7\\_96\\_B1\\_E7\\_96\\_AE\\_\\_c22\\_610320.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_84_93_E7_96_B1_E7_96_AE__c22_610320.htm)

脓疱疮又称黄水疮、传染性脓疱疮等，是一种由化脓性球菌引起的感染性皮肤病，临床上以疮内半月状积脓或蜜黄色脓痂为特征，具有接触传染性。【诊断】一、病史（一）多发生于夏季；（二）学龄前儿童多见；（三）常有接触史，或先有瘙痒性皮肤病如疥疮，痱子及湿疹等，（四）全身症状轻，皮疹泛发者可发生畏冷及发热；（五）反复发作者可引起肾炎。二、体征：（一）早期损害为红斑或水疱，以后迅速发展成脓疱，疱壁薄，金葡菌感染者，疱内脓液常沉积于疱底，呈半月积脓现象；溶血性链球菌感染者疱壁易破，脓液及渗液干燥后易形成蜜黄色脓痂，常因搔抓或痂下脓液外溢，细菌接种到脓痂周围或其他部位而发生新疹；（二）好发于颜面及四肢等暴露部位；（三）少数可发生毛囊炎、疖肿等。三、实验室检查（一）血常规：白细胞总数常升高；（二）脓液细菌培养：多数为金葡菌，少数为链球菌，也有混合感染者。四、鉴别诊断需与虫咬皮炎及水痘相鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）保持创面清洁干燥，避免搔抓及摩擦；（二）皮疹局限者给予局部治疗；（三）皮疹泛发或毒血症症状明显者应给予系统治疗；（四）并发肾炎者应及时处理。二、治疗方法（一）局部疗法 1.清洁创面:可用0.1%雷凡诺溶液或3%硼酸水清洗创面，去除脓痂. 2.杀菌止痒:要选用1%红霉素软膏，3%氟哌酸软膏及0.5%假单孢酸软膏外用，每日2~3次。（二）系统疗法 1.琥乙红霉素:每日每公斤体重25~50mg，分3~4次口

服，连服3天. 2.氟嗟酸:成人每次200mg，每日2次，连服3天，儿童慎用. 3.阿莫西林:每次口服0.25~0.5克，每日4次. 4.头孢氨节:每次口服0.5克，每日4次，儿童酌减. 5.交沙霉素:每次口服0.2~0.4克，儿童酌减；宜饭后服，妊娠早期忌用； 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)