

红癣_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_BA_A2_

[E7_99_A3__E7_9A_AE_c22_610327.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_BA_A2_E7_99_A3__E7_9A_AE_c22_610327.htm) 【症状】：红癣:损害最多见于大腿与阴囊接触的腹股沟部、腋窝、臀缝、乳房下、第四五趾间等皱折部位的皮肤。皮损为境界清楚、边缘不规则的斑片，开始呈红色，以后变成褐色。新的损害是光滑的，较老的损害起皱或有大量鳞屑。往往没有自觉症状，但在腹股沟部易受摩擦刺激，可引起瘙痒及苔癣样变。若损害累及肛门周围皮肤，可引起肛门瘙痒。还有一种泛发性红癣，常见于糖尿病及其他虚弱疾病的患者，皮损可广泛分布于躯干和四肢。【病理】：红癣，听起来很象是真菌引起的癣病，而其皮损也确实与体癣有些类似，但实际上红癣是由细菌引起的。病原菌的全名叫微细节棒状杆菌，常寄生于人的鼻、咽、眼结膜、外耳道及皮肤表面等处，故属于条件致病菌。本病可发生于任何年龄，但以成人多见。【治疗方法】：可口服红霉素，每次0.25g，每日4次，共用2周，可获暂时治愈。局部可应用癣药膏或硫磺水杨酸软膏。但本病治愈后容易复发，如经常使用抗菌肥皂，可预防复发。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com