

毛囊炎_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_AF_9B_E5_9B_8A_E7_82_8E__c22_610330.htm 毛囊炎是细菌侵入毛囊

口引起毛囊浅部或深部化脓性感染，好发于毛发分布部位，主要致病菌为金葡菌，主要损害为炎症性毛囊性丘疹，顶端化脓、轻度疼痛。【诊断】一、病史（一）多发生于炎热季节或卫生条件不佳者；（二）也可在瘙痒性皮肤病、糖尿病及机体抵抗力低下的基础上发病；（三）自觉微痒或轻度疼痛；（四）一般无发热等全身症状；（五）糖尿病及机体抵抗力低下者可反复发作。二、体征（一）早期损害为红色毛囊性丘疹，顶端迅速化脓，中央有毛发穿过，周围绕以红晕；以后脓疱干枯或破溃后结痂，痂皮脱落后痊愈；毛囊浅部受累，愈后不留疤痕；毛囊深部受累，愈后可形成疤痕并导致永久性脱发。（二）好发于头皮、颈部、背部及臀部，经常接触油漆或沥青者，面部及四肢也可受累。三、鉴别诊断需与毛囊性脓疱疮，疖及寻常痤疮鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）皮疹局限、初发者给予局部治疗；（二）皮疹泛发者应考虑系统治疗；（三）反复发作应进行免疫调节疗法；（四）有潜在疾病者应积极治疗原发病。二、治疗方法（一）一般疗法1. 保持局部清洁卫生，避免搔抓，摩擦；2. 忌酒类及辛辣刺激食品。（二）局部疗法 1. 氯柳酊:外搽患处，每日2次. 2. 硼锌鱼软膏:外搽患处，每日2次. 3. 0.5%假单孢酸软膏:外搽患处，每日2次. 4. 也可使用2.5%碘酊, 10%鱼石脂软膏、1%红霉素软膏等。（三）系统疗法根据病情的轻重及细菌培养药敏结果选择抗生素，一般选用复方新诺明、氟喹酸、

环丙沙星、新型青霉素、先锋霉素及卡那霉素等，儿童慎用喹诺酮类药。（四）免疫调节疗法可注射自家菌苗，也可注射丙种球蛋白。（五）物理疗法可选用紫外线及浅层x线治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com