

化脓性汗腺炎\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8C\\_96\\_E8\\_84\\_93\\_E6\\_80\\_A7\\_E6\\_c22\\_610332.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8C_96_E8_84_93_E6_80_A7_E6_c22_610332.htm) 化脓性汗腺炎是一种大汗腺慢性疼痛性化脓性炎症；主要致病菌为金黄色葡萄球菌。【诊断】一、病史（一）好发于中青年人；（二）自觉局部有不同程度的疼痛与压痛；（三）全身症状轻微；（四）病程慢，易于复发。二、体征（一）常见于腋窝，也可累及外生殖器部位及肛周；（二）早期损害为豌豆大小硬结，单发或多发；（三）以后硬结化脓、破溃形成潜行性溃疡、窦道或瘘管；（四）愈后形成增生性疤痕。三、鉴别诊断需与疖肿及淋巴结炎鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）未成脓者，采用抗生素和糖皮质激素联合治疗；（二）已成脓者宜切开引流。二、系统疗法（一）四环素：成人每次0.5克，每日4次，连服10天后改为每次0.25克，每日2次，连服2周。（二）强的松：每次10mg，每日2次，连服5~7天，适用于顽固性病例，常与四环素合用。三、局部疗法（一）0.1%雷凡诺尔溶液或0.5%新霉素溶液湿敷。（二）10%鱼石脂软膏：适用于未破溃的损害；（三）地新糠糊：外用，每日二次；（四）手术切开排脓：适用于脓肿已形成者。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)