

丹毒\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B9\\_E6\\_AF\\_92\\_\\_E7\\_9A\\_AE\\_c22\\_610334.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E4_B8_B9_E6_AF_92__E7_9A_AE_c22_610334.htm) 由 溶血性链球菌引起的皮内网状淋巴管的急性感染。好发于小腿及面部，易复发，起病急，蔓延迅速，一般不化脓。小腿反复发生丹毒后可导致象皮腿。【诊断】1. 发病初期，局部皮肤出现鲜红之斑疹块，边界清楚，微隆起，伴灼痛，指压病变区立即退色。2. 病灶向四周扩展时，中心部位颜色开始消退，有时出现大小不等的水疱或血疱。3. 常有畏寒，高热、头痛、乏力等全身症状。白细胞增加。4. 区域淋巴结常肿大，伴疼痛及压痛。【治疗】1. 卧床休息，加强营养，发生在下肢者应抬高患肢。2. 大剂量青霉素静脉滴注或肌注，直至局部病变消失。3. 50%硫酸镁局部持续湿热敷。4. 积极治疗口、鼻腔及足趾的感染病灶。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)