

水痘_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_B0_B4_E7_97_98__E7_9A_AE_c22_610345.htm 水痘系由水痘一带状疱疹病毒引起的急性传染性病毒性皮肤病。好发于儿童，常累及皮肤与粘膜，临床上表现为孤立的小水疱，边缘有红晕，全身症状多较轻微。

【诊断】一、病史（一）常有接触水痘患者或周围人群中水痘流行；（二）潜伏期2~3周；（三）发疹前有发热、头痛、咽痛、呕吐、腹痛及全身酸痛等前驱症状；（四）皮疹微痒；（五）自然病程2~3周。二、体征（一）早期损害为红色针头大斑疹，继之发展成丘疹及米粒大水疱，周围绕以红晕，后期水疱顶部略有凹陷；（二）皮疹以躯干居多，面部及四肢较少，呈向心性分布；（三）口腔、睑结膜及肛门粘膜也可受累，以口腔腭部发疹多见；（四）皮疹分批出现，可见丘疹、水疱及结痂同时存在；（五）偶尔发生水痘性肺炎、脑炎及暴发性紫癜等并发症。三、鉴别诊断需与虫咬性皮炎及脓疱疮等鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）注意早期隔离；（二）积极抗病毒治疗；（三）预防继发感染；（四）防止并发症的发生。二、治疗方法（一）一般治疗1. 发热时应卧床休息，给予足够的水分及易消化的食物，必要时给予解热镇痛剂；2. 氯霉素炉甘石洗剂：外搽患处，每日2~3次，适用于水疱未破者；3. 红霉素软膏：适用于水疱已破者。（二）抗病毒治疗1. 阿昔洛韦：每次每公斤体重3~7毫克，每日3-5次，连服5天。2. 板蓝根冲剂：每次10克，冲服，每日3次。（三）预防继发感染皮疹泛发者应考虑给予抗生素以预防继发感染。 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com