

羊痘_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_BE_8A_E7_97_98__E7_9A_AE_c22_610347.htm 羊痘 (qrf) 是羊感染一种病毒后，皮肤上发生化脓性炎症，再传染给人，使人发生羊痘。

【诊断】根据接触史，典型皮疹及自愈过程，一般可做诊断。如有怀疑，可将损害的痂皮或活检组织放在电镜下观察，如发现病毒包涵体，则诊断是无疑的。【治疗措施

】1.避免接触患羊痘的绵羊和山羊。2.对2~3周羔羊接种羊痘活病毒疫苗可终生免疫。3.患者一般进行对症治疗。【病因学

】本症是羊痘病毒所致。这是一种乙醚敏感的dna病毒，此病毒主要是侵犯羊，人是由于接触病羊污染的物质而被感染。故多见于牧羊人，兽医及屠宰人员等，目前尚无人与人之间互相传染的报导。传染后有终生免疫力，病毒接种在人体后获得成功。把人和动物的损害进行组织培养有病毒生长。

【临床表现】潜伏期5~6天，初起为红色或紫红色的小丘疹、质地坚硬，以后扩大成为顶端扁平的水疱、能发展成出血性大疱或脓疱，中央可有脐凹，大小为3~5cm。在24~48小时内疱破表面覆盖厚的淡褐色焦痂，痂四周有较特殊的灰白色或紫红色晕，其外再绕以红晕，以后变成乳头瘤样结节。最后变平、干燥、结痂而自愈。病程一般为3周，也可长达5~6周，获得永久性免疫。皮疹数目不多，为单个或数个，好发于手指、前臂及面等暴露部位。除了局部有轻微肿痛外，无全身症状或仅有微热，局部淋巴结肿大。有些人在发病后2周，于躯干部出现一过性斑丘疹，亦可在四肢伸侧出现多形红斑样皮疹。【辅助检查】组织病理：表皮内有明显的细胞

内及细胞间水肿，空泡形成及气球样变性，真皮有密集
的细胞浸润，中央主要由组织细胞和巨噬细胞，周围有
淋巴细胞和浆细胞，很少见多形核白细胞浸润。整个
损害有许多内皮细胞增生和肿胀的小血管。在真皮血
管内皮细胞的胞浆里可以见到嗜酸性包涵体。100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访
问 www.100test.com