

寻常疣_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_AF_BB_E5_B8_B8_E7_96_A3__c22_610348.htm 寻常疣系人类乳头瘤病毒引起的增生性病毒性皮肤病；皮疹呈孤立性乳头状隆起，表面粗糙，无自觉症状。【诊断】一、病史（一）好发于儿童及青少年；（二）无自觉症状；（三）自然病程2~3年；（四）疣体基底部发痒或肿胀时有消退或播散趋势。二、体征（一）早期皮疹为针头大丘疹，以后可发展成豌豆至蚕豆大损害，呈圆形、多角形或不规则形；表面粗糙，角化明显，呈褐黄色或污褐色，磨擦或碰撞时会出血；（二）好发于手指、手背及足缘，其他部位亦可发疹；（三）眼睑、颈部及颊部的损害常呈丝状突起，称丝状疣；头皮及趾间的损害则呈参差不齐的指状突起，称指状疣。甲周损害疣体易向下蔓延，破坏甲的生长，发生裂口疼痛及继发感染。三、组织病理表皮角化过度，棘层显著肥厚，表皮突下延，真皮乳头呈乳头瘤样增生；早期损害的棘层上部及颗粒层可见灶性空泡化细胞，其上方可见柱状成层排列的角化不全细胞，疣状突起的峡谷处，颗粒层增厚，并有灶性透明角质颗粒浓集。四、鉴别诊断需与传染性软疣及疣状表皮发育不良鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）提高机体免疫力，促进疣体消退；（二）对症治疗，去除疣体。二、治疗方法（一）免疫调节疗法 1.左旋咪唑:成人每次口服50mg，每日3次，每1~2周连服3天为一疗程，儿童慎用. 2.聚肌胞:每次肌注2~4mg,隔日一次，15次为一疗程。（二）对症治疗 1.3%酞丁胺软膏:外搽患处，每日2次. 2.5%氟尿嘧啶软膏.外搽患处，每日1次.面部皮

损慎用. 3. 平阳霉素损害内注射: 用平阳霉素10mg以1%奴佛卡因20ml稀释, 在每个疣体基底部注射0.2~0.5ml, 每周1次。

(三) 其他疗法 1. 刮除法: 用刮匙在疣体根部用力推动, 刮净残余疣组织, 压迫止血, 再以2%~5%碘酊, 避免浸水. 2. 冷冻疗法、电灼疗法及激光治疗: 适用于疣体数目较少者。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com