

跖疣\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B7\\_96\\_E7\\_96\\_A3\\_\\_E7\\_9A\\_AE\\_c22\\_610349.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_B7_96_E7_96_A3__E7_9A_AE_c22_610349.htm)

跖疣是由人类乳头瘤病毒引起的跖部增生性病毒性皮肤病。临床表现为趾腹或跖部表面粗糙的角质性丘疹或斑块，损害常会自体接种，局部压痛明显。【诊断】一、病史（一）跖部外伤、磨擦及多汗可促进本病的发生；（二）压迫疣体会痛，影响行走；（三）病程慢，可自然消退。二、体征（一）早期损害为发亮的小丘疹，以后逐渐增大，表面粗糙，角化过度，刮去表皮角质层中心可见点状出血；（二）损害呈黄色、灰黄色或污灰色，圆形或不规则形，较大的损害周围常绕以增厚的角质环；（三）损害可单发，亦可多发，有时在较大的疣体周围可见针头至米粒大的散在性小疣体，疣体可相互融合成块。（四）疣体捏痛比压痛更明显；（五）好发于足跖前后受压处及趾部。三、组织病理跖疣与寻常疣基本相同，但整个损害嵌入真皮，角化过度更明显，角化不全更广泛，棘层上部细胞空泡化显著，构成明显的网眼状。四、鉴别诊断需与鸡眼及胼胝鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）采用局部治疗；（二）尽快去除疣体；（三）减少或避免复发。二、治疗方法（一）5%氟尿嘧啶软膏，局部封包治疗，每日一次。（二）盐酸平阳霉素损害内注射：以平阳霉素10mg加1%普鲁卡因2ml稀释后，在疣体基底部注射，每个疣体0.2~0.5ml，每周一次，每次总量不超过6ml。（三）病毒灵注射液损害内注射：在每个疣体基底部注射病毒灵0.3~0.5ml。每周一次。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)