

扁平疣\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_81\\_E5\\_B9\\_B3\\_E7\\_96\\_A3\\_\\_c22\\_610350.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_89_81_E5_B9_B3_E7_96_A3__c22_610350.htm)

扁平疣是由人乳头瘤病毒引起的增生性病毒性皮肤病；主要损害为正常肤色或浅褐色平顶丘疹，可自体接种，病程较慢。【诊断】一、病史（一）好发于青少年；（二）多无自觉症状，但皮疹趋于消退或播散时会痒；（三）搔抓或磨擦皮疹时会引起自体接种；（四）病程慢，可自行消退；（五）愈后不留痕迹。二、体征（一）损害为针头至米粒大平顶丘疹，表面光滑，圆形或不规则形，黄褐色或正常肤色；（二）皮疹数目较多，可相互融合，自体接种的皮疹常呈条状排列；（三）好发于面部、手臂、前臂等处，偶见于下肢。三、组织病理角化过度，颗粒层及棘层增生，表皮突轻微下延，颗粒层及棘层细胞空泡化明显，空泡化的细胞核深染；角质层细胞因空泡化而成网篮状；真皮内无特异性变化。四、鉴别诊断需与汗管瘤、皮脂腺增生及胶样粟丘疹鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）提高机体免疫力，促进疣体消退；（二）尽可能彻底去除疣体，避免疤痕形成，避免复发。二、治疗方法（一）局部疗法 1. 3%酞丁胺软膏:外涂患处，每日2次. 2. 0.05%维甲酸霜:外涂患处，每日1~2次。（二）系统疗法 1. 左旋咪唑:成人每次50mg，每日3次，服3天停11天为一疗程，儿童慎用. 2. 聚肌胞. 每次2~4mg，肌注，隔日或3天一次. 连用一个月为一疗程. 3. 胸腺因子d: 每次10mg，肌注。隔日1次. 连用一个月为一疗程. 4. 板蓝根注射液: 每次2ml，肌注，每日1次. 连用10天为一疗程. 5. 甲氰咪呱，每次口服0.2~0.4克，每日3次. 连用一个月为一

疗程。（三）物理疗法可选用冷冻、电灼、电解、电干燥或透热疗法。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)