

疣状表皮发育不良_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_96_A3_E7_8A_B6_E8_A1_A8_E7_c22_610351.htm

疣状表皮发育不良是一种由人类乳头瘤病毒引起的泛发性疣；损害可呈扁平疣样，花斑癣样及点状疤痕样，有演变上皮癌的趋势。【诊断】一、病史（一）通常幼年发病，也可发生于其他年龄组；（二）多无自觉症状，（三）病程极慢，无自行消退倾向，（四）20%的病人某些损害会演变成鲍温氏病、鳞状细胞癌或基底细胞癌。二、体征（一）扁平疣样疹：表现为米粒至黄豆大扁平丘疹，表面粗糙，略有光泽，呈暗红色、紫红色或褐色；（二）花斑癣样疹；表现为淡白色扁平丘疹，略高于皮肤，，脱屑明显；（三）点状疤痕样疹；少见，皮疹轻度凹陷，角化轻微；（四）好发部位：多见于暴光部位，如面部、手背及颈部；也见于非暴光部位，如躯干、四肢、掌跖、腋窝及外阴；（五）其他损害：可见掌跖角化过度、指甲改变、雀斑样痣及智力发育迟缓。三、组织病理表皮角化过度，棘层肥厚，颗粒层及棘细胞层广泛空泡形成呈网篮状，核存在，未见角化不良细胞。【治疗】一、治疗原则（一）提高机体免疫力，促进皮疹消退；（二）避免日光暴晒，预防癌变。二、治疗方法（一）局部疗法 1.5%氟尿嘧啶软膏：外搽患处，每日1~2次. 2.0.05%维甲酸霜：外涂患处，每日1~2次。（二）系统疗法 1.聚肌胞：每次2~4ml，肌注，隔日1次. 2.胸腺因子d：每次10mg，肌注，每日或隔日1次. 3.依曲替酯：每日每公斤体重0.7mg,分3次口服。（三）特殊疗法 1.手术切除：有恶变倾向或已恶变的皮损要考虑手术切除；2.醋蛋疗法

：取煮熟鸡蛋一粒，去壳穿洞后浸于50ml 黄醋中，6小时后食蛋饮醋，每日一次，连服一月为一疗程。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com