

传染性红斑_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E4_BC_A0_E6_9F_93_E6_80_A7_E7_c22_610354.htm 传染性红斑可能是由病毒引起的一种传染病，又称第五病，临床上首先在双面颊出现水肿性玫瑰样红斑，1~2天后在躯干、臀部及四肢出现境界清楚对称分布的花边状或网状斑丘疹，全身症状较轻。

【诊断】一、病史（一）多在春季发病；（二）好发于4~12岁儿童，常在幼儿园及小学流行。（三）潜伏期5~14天。（四）皮疹早晨不明显，午后热时较清晰。（五）全身症状轻微，可有低热及咽痛。（六）自然病程1~2周，皮疹消后不留痕迹。二、体征（一）早期皮疹为水肿性玫瑰色样红斑，蝶形，境界清楚，分布于双侧面颊部；（二）1~2天后出现境界清楚对称分布的花边状或网状斑丘疹，分布于躯干、臀部与四肢；（三）皮疹从中央消退，形成一红色小环，并可与邻近的皮疹融合呈多环状；（四）可有扁桃腺炎、结膜炎及局部淋巴结肿大。三、实验室检查外周血白细胞总数大致正常或减少，早期淋巴细胞相对减少，后期淋巴细胞及嗜酸性粒细胞增多。【治疗】一、治疗原则（一）注意隔离；（二）对症治疗。二、治疗方法一般不需特殊治疗，有瘙痒者可给予炉甘石洗剂安抚止痒。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com