

癣菌疹\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E7\\_99\\_A3\\_E8\\_8F\\_8C\\_E7\\_96\\_B9\\_\\_c22\\_610361.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_99_A3_E8_8F_8C_E7_96_B9__c22_610361.htm) 【症状】：癣菌疹:(1)

急性播散性癣菌疹 全身突然出现大量不同形态的皮疹，以针头大的尖或平顶状丘疹为主，常为毛囊性、苔癣样或鳞屑性损害。有时也可呈麻疹样或猩红热样损害。同时原发病灶处病情加重，可出现小水疱。本型多见于头癣患者，可伴有发热、食欲减退、全身淋巴结肿大、脾肿大及白细胞增多。(2) 疹样癣菌疹 原发病多为脚癣，皮疹常发生手指侧面，有时也可发生于手掌和脚底。皮疹主要为水疱，针头至米粒大小，瘙痒剧烈，有时可伴有压痛。若继发细菌感染，水疱可变成脓疱。(3) 红斑结节样癣菌疹 表现各异，但都无水疱，且不只限于手掌及指侧。根据皮损特点不同分别可呈现出结节性红斑样、远心性环状红斑样、游走性栓塞性脉管炎样、丹毒样及荨麻疹样损害。 【病理】：癣菌疹是由癣病皮损中的真菌引起过敏反应而发生皮疹的一种疾病。一般癣病中的真菌仅寄生于皮肤角质层内，即使它有抗原性因不被吸收入血而不引起机体产生抗体，也不会发生过敏反应。如癣病皮损很活跃，局部红肿明显，真菌可侵入真皮通过局部血管进入血液循环。若此时机体非常敏感会立即产生相应的抗体，并与皮肤上的真菌抗原相结合而发生过敏反应，使皮肤表现出各种皮疹。 【治疗方法】：癣菌疹的治疗应以治疗原发病灶为主，外用抗真菌药物。一、在原发灶积极抗真菌治疗，但切忌过于刺激的药物。二、抗真菌剂：伊曲康唑或特比萘芬。三、抗组胺药，静注葡萄糖酸钙，维生素c，或硫代硫酸钠。四、

短期小量皮质激素。皮疹根据外用药原则处理，急性皮炎可湿敷，用止痒收敛的药物如硼酸、炉甘石洗剂、氧化锌油等，干燥后用激素类冷霜。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)