

钩蚋皮炎（匍行疹）\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E9\\_92\\_A9\\_E8\\_9A\\_B4\\_E7\\_9A\\_AE\\_E7\\_c22\\_610367.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_92_A9_E8_9A_B4_E7_9A_AE_E7_c22_610367.htm)

**【症状】**：感染后数小时内在狗、猫感染性幼虫入侵部位出现红色丘疹，继以红肿和水泡形成。2-3天内幼虫开始在皮内移行，形成匍行疹。皮疹红色，线状，略高于皮肤表面，伴奇痒，尤于夜间为甚，以足部皮肤多见，手部次之，一般于一周内逐渐消退，也可持续数月。因搔抓引起继发感染者并不少见。其它蠕虫蚋匍行疹与钩虫所致者相仿，但幼虫移行速度略异，幼虫存活和皮疹持续时间不同，少者数天，长者可达数月。此外巴西钩虫与犬钩虫蚋偶可引起肺部短渐游走性浸润。

**【病理】**：人体皮肤与被动物粪便污染的土壤接触后，其中的感染性幼虫即从皮肤侵入，不能穿达生发层下，仅能在真皮和粒层间以每日数毫米至数厘米的速度移行，产生蜿蜒隧道；后者外观呈红色硬斑，有时有水泡形成。组织学检查显示隧道周围有嗜酸粒细胞浸润。

**【治疗方法】**：避免与狗、猫、羊等家畜粪便污染的土壤接触，定期给狗、猫驱虫，以消灭传染源。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)