

隐翅虫皮炎_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_9A_90_E7_BF_85_E8_99_AB_E7_c22_610369.htm 隐翅虫皮炎是人体皮肤

接触到隐翅虫体内的强酸性物质而引起的一种腐蚀性皮炎；若患者手指接触患处后再搔抓其他部位，可出现新的损害。

【诊断】一、病史（一）常于夏秋季节发病；（二）皮疹常在晨起后才发现；（三）自觉患处烧灼感、微痒或不适；

（四）严重者可有头痛、恶心、呕吐，甚至发烧；（五）自然病程一周左右，愈后留有色素沉着斑。二、体征（一）好发于面颈部、胸背部及四肢等暴露部位；（二）早期损害为水肿性红斑，之后在红斑上出现小脓疱，皮损中央常见坏死，糜烂及渗出；（三）皮疹常呈条状，片状或带状，因搔抓而出现的皮疹常呈抓痕状；（四）严重者可出现近卫淋巴结肿大。三、鉴别诊断需与接触性皮炎及脓疱疮等鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）中和毒素；（二）收敛止痛；（三）预防继发感染。二、治疗方法（一）局部疗法 1.湿敷:可選用5%碳酸氢钠溶液或1:8000高锰酸钾溶湿敷，每次15~30分钟，每日2~3次. 2.南通蛇药片:研粉加食醋或冷开水调成糊状外用，每日2-3次. 3.氯霉素炉甘石洗剂:外用，每日3~5次。（二）系统疗法: 1.病情轻者口服抗组胺制剂，如赛庚定每次2mg，每日3次，连服3~5天. 2.病情重者应加服糖皮质激素制剂，如强的松10mg，每日2次，连服3~5天. 3.皮损泛发或有继发感染者应加服抗菌素，如琥乙红霉素，每次0.25克，每日4次，连服3天。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com

。详细请访问 www.100test.com