

臭虫、蚤叮咬皮炎\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E8\\_87\\_AD\\_E8\\_99\\_AB\\_E3\\_80\\_81\\_E8\\_c22\\_610370.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_87_AD_E8_99_AB_E3_80_81_E8_c22_610370.htm) 虫咬性皮炎是指因蚊子、蠓、白蛉子、跳蚤、臭虫、蒲螨及粉螨等叮咬后引起毒性反应和过敏反应而发生的皮炎。【诊断】一、病史（一）多见于夏秋季节；（二）自觉奇痒、刺痛或灼痛；（三）病程长短不一，轻者数小时皮疹可消退，病情严重者可长达数月，一般5~7天后皮疹可消退。二、体征（一）好发于背部、四肢及面颈部，以双下肢最常见；（二）常见皮疹为瘀点，小丘疹及梭形丘疱疹，也可见到水疱、大疱、瘀点或紫癜，反复搔抓者皮疹可演变成硬结。【治疗】一、治疗原则（一）止痒，消炎；（二）缩短病程；（三）防治继发感染。二、治疗方法（一）局部疗法 1.炉甘石洗剂:外用，每日2~3次。2.糖皮质激素软膏或霜剂:外用，每日2~3次。（二）系统疗法 1.抗组胺制剂:适用于病情轻者，可用扑尔敏，每次4mg，每日3次，连服3天.儿童每日每公斤体重0.35mg.也可用克敏、息斯敏、开瑞坦等。 2.糖皮质激素:适用于病情重者，可用强的松每次5~10mg，每日2次，连用3天。 3.抗菌素：适用于有继发感染者，可用琥乙红霉素，成人每次0.25克，每日4次；儿童每日每公斤体重25~50mg。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)