

结节性痒疹_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_BB_93_E8_8A_82_E6_80_A7_E7_c22_610396.htm 【症状】：结节性痒疹:1.多见于成年女性，皮损好发于四肢，也可见于腰臀部，最多见于小腿伸侧；2.皮损初起为淡红色丘疹，以后演变为黄豆至蚕豆大小的半球形坚实结节，表面粗糙呈疣状，为红褐色或灰褐色，可有抓痕及血痂，皮损数目不定，孤立存在；3.病程慢性，常年不愈，自觉剧痒。【病理】：目前认为本病是局限性神经皮炎的变型，临床上以伴有剧痒的疣状结节为主要特征。病因尚不明确，可能与昆虫叮咬、胃肠功能紊乱及内分泌障碍有关。【治疗方法】：1.防治昆虫叮咬等各种诱发因素；2.内服抗组胺药物及镇静安眠药物；3.严重时可使用乙双吗琳、反应停、雷公藤及皮质类固醇等药物；4.局部外用皮质类固醇软膏封包或硬膏外贴，也可局部封闭、冷冻治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com