

急性发热性嗜中性皮病_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_80_A5_

[E6_80_A7_E5_8F_91_E7_c22_610426.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_80_A5_) 【症状】：急性发热

性嗜中性皮病:1.发热、肌痛及大关节游走性疼痛；2.早期皮疹多为渗出性红斑或丘疹；3.典型皮损是扁平隆起呈多环形、圆或卵圆形的红斑，边缘常见假性水状颗粒或乳头状突起，个别出现暗红色大；4.眼结膜充血，口腔粘膜糜烂、溃疡；

【病理】：急性发热性嗜中性皮病是由于中性粒细胞增多，广泛浸润真皮浅、中层引起的皮肤疼痛性隆起性红斑，同时伴有发热及其他器官损害，又名Sweet综合征。该病多急性起病，好发于夏秋季，中年以上女性多见。在发病前1 - 2周常有流感样上呼吸道感染、支气管炎、扁桃体炎等先驱症状。该病对皮质激素疗效较好，经及时、恰当的治疗，症状一般均可缓解。 【治疗方法】：1.寻找和去除病因，避免各种诱发因素；2.非特异性抗过敏治疗；3.降低毛细血管通透性和脆性；4.皮质激素及免疫抑制剂治疗；5.对症支援治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com