

持久性隆起性红斑_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_8C_81_E4_B9_85_E6_80_A7_E9_c22_610427.htm 【症状】：持久性隆起性红斑:好发于成年人，男女发病率相似，以四肢伸侧，特别是手、足及膝关节伸侧及臀、面等处多见，很少侵犯躯干，对称发生，特征性皮损：表面光滑，鲜红、紫红或带黄色斑块，圆或卵圆形，可融合成不规则形状，少数可发生水疱、溃疡，皮疹反复发生，病程几周至数月，可迁延多年，愈后遗留皮肤萎缩、色素沉着或色素脱失斑，有溃疡者留瘢痕，自觉症状：痒、压痛或灼痛。 【病理】：持久性隆起性红斑(erythema elevatum diutinum)原因不明。发病机制与白细胞碎裂性血管炎有关。 【治疗方法】：1. 首选氨苯砞，100-150mg/日。用药期间应注意药物的副作用. 2. 必要时可服用皮质类固醇激素，如强的松. 3. 有感染病灶的应使用抗生素。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com