

色素性紫癜性皮肤病_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_89_B2_E7_B4_A0_E6_80_A7_E7_c22_610430.htm

色素性紫癜性皮肤病是一组原因不明的毛细血管炎，包括进行性色素性紫癜性皮炎、色素性紫癜性苔藓样皮炎及毛细血管扩张性环状紫癜。

这三种病在组织病理及发病机制上有很多相似之处；在临床上虽然皮疹形态各异，但均以下肢色素沉着及点状紫癜性损害为特征。【诊断】一、进行性色素性紫癜性皮炎（一）病史 1.好发于中青年男性. 2.常与剧烈运动有关. 3.有家族发病倾向. 4.一般无自觉症状或仅有轻微的瘙痒. 5.病程慢，可达数月

至数年。（二）体征 1.好发于胫前、踝周与足背，也可见于膝部与大腿；皮疹不对称分布；2.早期损害为群集的针头大小的胡椒粉样瘀点，密集成片，边缘呈锯齿状，瘀点疏密不一，可呈网状或岛屿状；陈旧性损害呈浅棕黄色或棕褐色斑；

通常在旧的损害内或边缘出现新的损害；3.皮疹消退后留下色素沉着斑。二、色素性紫癜性苔藓样皮炎（一）病史 1.常见于中老年人，男性多于女性；2.瘙痒明显；3.病程慢，常持续存在。

（二）体征 1.皮疹好发于下肢及躯干下部，以小腿多见，对称分布；2.早期损害为针头至米粒大小圆形或多角形紫红色或棕红色丘疹，压之不褪色，最后演变成铁锈色苔藓样丘疹，常成簇排列或融合形成境界不清的斑块；3.皮疹消退后留有色素沉着。

三、毛细血管扩张性环状紫癜（一）病史 1.常见于青年女性；2.一般无自觉症状；3.病情反复，迁延数年后可自愈。

（二）体征 1.皮疹好发于小腿伸侧，也可见于大腿，前臂、臀部及躯干；对称分布；2.早期损害

为毛囊周围毛细血管扩张及点状出血；扩张的毛细血管多排列成半环状，环状、线状或斑状，斑状损害呈离心性扩大，边缘可见新的毛细血管扩张及出血点；陈旧性斑呈黄褐色；3. 皮疹消退后留下轻微的皮肤萎缩。四、实验室检查（一）束臂试验：阴性；（二）血液流变学：示高凝状态。五、组织病理表现为真皮上部浅层细小血管炎，毛细血管内皮细胞肿胀，血管周围中等度淋巴细胞和组织细胞浸润，真皮乳头水肿，可见散在的红细胞外溢及噬含铁血黄素细胞。【治疗】一、治疗原则（一）去除可疑的致病或加重病情的因素；（二）提高血管致密度，降低毛细血管通透性；（三）促进炎症消退，缩短病程。二、治疗方法（一）局部疗法糖皮质激素制剂：可选用乐肤液，去炎松尿素霜等外用，每日2次。（二）系统疗法 1. vite:每次0.1克，每日3次. 2. vitc:每次0.1克，每日3次. 3. 复方路丁:每次2片，每日3次. 4. 复方丹参片:每次2~3片，每日3次. 5. 确炎舒松a:每次25~40mg肌注，每2周一次，连用3次。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com