

脂溢性皮炎_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_84_82_E6_BA_A2_E6_80_A7_E7_c22_610433.htm

脂溢性皮炎是一种发生在皮脂溢出基础上的炎症性皮肤病；近来研究认为与糠秕孢子菌感染有关；临床上以皮脂溢出区出现境界不清的红色斑片，上覆油痂或油腻性鳞屑为特征。【诊断】一、病史（一）多见于20~40岁的成人及2~10周的婴儿；（二）常因精神紧张，嗜酒及吃辛辣油炸食品而发病或加重；（三）自觉有不同程度的瘙痒；（四）病程慢，反复发作。二、体征（一）皮疹见于头皮、眉弓、鼻唇沟、肩胛间区，上胸、腋窝及阴囊等处；（二）头部损害表现为灰白色糠秕状或油腻性鳞屑性红色斑片，有时可见针头至米粒大红色毛囊性丘疹；（三）前额损害为弥漫性红色油腻性斑片；眉弓损害脱屑明显；鼻唇沟损害油腻性鳞屑成堆，下方可见暗红斑；（四）上胸及肩胛间区损害早期为附有油腻性鳞屑的红褐色毛囊性丘疹，以后可演变成上附油腻性鳞屑的环状或片状斑疹；（五）皱襞部位损害易形成间擦疹；（六）婴儿脂溢性皮炎油腻性黄痂多，炎症反应明显；（七）中老年人皮损常趋于湿疹化。三、鉴别诊断需与头皮银屑病、玫瑰糠疹、体癣及湿疹鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）去除诱发因素，清淡饮食；（二）抑制皮脂分泌；（三）消炎去屑止痒。二、治疗方法（一）局部疗法1. 复方硫洗剂：外用，每日2次，适用于面部及躯干部皮损；2. 氯柳酊：外用，每日2次，适用于头部皮损；3. 氯洁霉素氢化可的松霜：外用，每日2次，适用于面部皮损；4. 酮康唑洗剂：如采乐洗剂，外用，每周2次，洗

头；5. 煤焦油洗剂：如泽它洗剂，外用，每周2次，洗头。（二）系统疗法 1.复合维生素b:每次2片，每日3次. 2.维生素b6:每次20mg，每日3次. 3.糖皮质激素:强的松每次5~10mg,每日2次，适用于炎症明显而皮疹广泛者. 4.维胺酯:每次25~50mg，每日2~3次. 5.四环素:每次0.25克，每日3~4次. 6.红霉素:每次0.25克，每日3~4次. 7.抗组胺药:可选用克敏每次2.5mg或康夫丽尔每次25mg，每日2次.适用于瘙痒明显者。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com