

斑秃_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_96_91_E7_A7_83__E7_9A_AE_c22_610438.htm

斑秃是一种突然发生片状脱发的皮肤附属器疾病；其发病可能与精神紧张、劳累过度、遗传因素及免疫因素有关；临床上以头部出现单发或多发的片状脱发为特征；若头发全部脱落则称为全秃，全身毛发均脱落称为普秃。【诊断】一、病史（一）常见于青少年；（二）多发生于极度烦恼、惊恐、劳累过度及机体免疫功能紊乱之后；（三）无自觉症状，常被别人所发现；（四）部分患者有自愈倾向，容易复发。二、体征（一）多见于头部毛发分布区，呈单发或多发；严重者可累及整个头皮，甚至全身毛发分布区；（二）损害大小不等，境界清楚；患处毛发通常完全脱落，或残留数根不脱；（三）脱发区皮肤外观正常，发作期触之松软如海绵；恢复期触之较坚实；（四）发作期损害周围毛发松动，容易脱落，恢复期这种现象消失；（五）新生毛发纤细柔软，呈灰白色，可随长随脱，或逐渐变粗变黑。三、鉴别诊断需与假性斑秃，疤痕性脱发、黄癣及早秃鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）镇静安神，减轻心理压力；（二）改善微循环，促进毛发生长；（三）调节免疫功能，以利毛发生长。二、治疗方案（一）局部疗法 1.1%~3%长压定溶液:外涂患处，每日2次，连用2个月以上. 2.30%补骨脂酊:外用，每日2次. 3.损害内注射:小片状单发损害可采用确炎舒松a10~15 mg加2%利多卡因1~2ml损害内注射，每周1次，连用2次。（二）系统疗法1.赛庚定:每次2mg，每日3次.适用于精神紧张，睡眠不佳者； 2.复合维生素b:每

次2片，每日3次. 3.维生素e:每次0.1克，每日3次. 4.强的松:每次15~20mg，每日2次，病情控制后每周递减5mg，最后以隔日10mg维持3个月。适用于顽固性、泛发性或反复发作的病例. 5.斑秃丸:每次5克，每日3次，连服1~2个月。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com