

白癜风_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_99_BD_E7_99_9C_E9_A3_8E__c22_610449.htm 白癜风是一种由于多种

原因导致皮肤色素细胞减少或功能丧失从而产生色素脱失斑的色素障碍性皮肤病；临床上以皮肤及皮肤粘膜交界处出现乳白色斑为特征。【诊断】一、病史（一）任何年龄均可发病，青少年居多；（二）一般无全身症状及自觉症状；一旦皮损处发痒则预示病情活动；（三）病程长短不一，容易复发。二、体征（一）皮疹多呈局限分布，少数可泛发全身；好发部位为面颈部、手指、手背、前臂及腔口部位；常对称分布，也可沿神经节段分布；（二）完全型损害为乳白色斑疹或斑片；不完全型损害为白斑中有色素岛；进展期白斑边缘模糊不清，稳定期白斑境界清楚；白斑周围肤色正常或略有加深；（三）白斑区毛发早期正常，严重者可发白；（四）伍德氏灯照射皮损，白斑颜色更加明显，呈瓷白色。三、鉴别诊断需与贫血痣、花斑癣、单纯糠疹、硬化萎缩性苔藓及粘膜白斑鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）去除一切可疑的诱发因素；（二）早发现早治疗；（三）活动期损害采用免疫抑制疗法；（四）顽固性损害采用免疫刺激疗法或表皮移植。二、治疗方法（一）局部疗法 1.糖皮质激素制剂:可选用乐肤液、恩肤霜、适确得等外用，每日1—2次.不宜长期使用. 2.0.2%8-甲氧补骨脂素液或30%补骨脂酊:外用，每日1~2次，使用时应控制用量，一旦出现红肿、瘙痒或起疱应及时处理.炎症反应消退后再少量使用. 3.0.05氮芥酊(白癜净):外用，每日2次.使用时也应注意炎症反应。（二）系统疗法 1.糖皮

质激素:适用于病情活动期.可选用强的松,每次15~20mg,每日2次,病情控制后逐渐减量. 2.8-甲氧补骨脂素:每日每公斤体重0.2~0.5mg,分2~3次口服.局部配合长波紫外线照射,效果更佳; 3.胸腺因子d:每次10mg肌注,每日或隔日一次,1~3个月为一疗程。(三)表皮移植疗法选择色素正常的非暴露部位作供皮区;皮损区为受皮区;供皮区和受皮区同时采用负压起疱法取皮;将受皮区疱顶表皮去除,移植供皮区的疱顶表皮;敷料或创可贴包扎固定一周,2~3周后移植区开始产生色素。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com