

接触性唇炎_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_8E_A5_E8_A7_A6_E6_80_A7_E5_c22_610459.htm 接触性唇炎是指唇部接触化学物质后而发生局部刺激或过敏反应的粘膜疾病；女性多见；常见致病物质有油彩、唇膏、牙粉、石炭酸及苯唑卡因等；临床上以唇部出现红肿、水疱、糜烂或干燥、脱屑、皲裂为特征。【诊断】一、病史（一）女性多见；（二）发病前常有局部使用唇部化妆品及治疗某些皮肤病的外用药；（三）停止使用刺激物后病情减轻，再用时病情加剧；反复使用可使病情反复不愈。二、体征（一）皮损主要见于唇部，也可见于周围皮肤，受累范围与刺激物使用的面积大体一致；（二）急性期损害表现为口唇红肿、可见水疱、糜烂及结痂；（三）反复不愈者可见口唇肿胀、浸润、肥厚、干燥、脱屑甚至皲裂。三、鉴别诊断需与剥脱性唇炎，光化性唇炎及腺性唇炎等鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）去除病因；（二）局部使用糖皮质激素软膏。二、治疗方法（一）1%氢化可的松软膏:外用，每日2次。（二）去炎尿素霜:外用，每日2次。（三）肤轻松软膏:外用，每日2次。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com