

包皮龟头炎_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8C_85_

[E7_9A_AE_E9_BE_9F_E5_c22_610461.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8C_85_E7_9A_AE_E9_BE_9F_E5_c22_610461.htm) 包皮龟头炎是指由各种原因引起包皮及龟头发生急性、亚急性或慢性炎症；临床上以包皮和龟头出现水肿性红斑、丘疹、丘疱疹、糜烂、渗液、结痂、或干燥、脱屑为特征。【诊断】一、病史（一）多见于成人；（二）可有包茎、包皮过长、包皮垢过多、理化因素刺激、外伤及各种感染现象存在；（三）自觉患处瘙痒、灼热或疼痛；（四）一般无全身症状，严重者可有畏冷、发热及全身不适等症状。二、体征（一）多见于龟头、亦可累及包皮；（二）急性浅表性龟头包皮龟头炎：表现为局部红斑、水肿、糜烂及渗液；严重者可出现水疱及大疱；（三）环状糜烂性龟头包皮龟头炎：早期在龟头及包皮处出现红斑，以后逐渐扩大形成环状或多环状损害，日久形成浅表溃疡，可见乳酪状或蜜黄色痂；（四）念珠菌性龟头包皮龟头炎：龟头上出现红斑、丘疹、丘疱疹，或有白色乳酪状分泌物，可有片状糜烂；（五）浆细胞性龟头包皮龟头炎：龟头上可见单个或多个浸润性红斑，表面光滑，放大镜下可见损害表面有胡椒粉样小斑点。三、鉴别诊断需与生殖器疱疹及固定性药疹等鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）寻找并去除病因；（二）减少创面渗出，促进损害愈合。二、治疗方法（一）局部疗法 1.湿敷:可用3%硼酸水或0.1%雷凡诺溶液湿敷，每次15~20分钟，每日3~5次.适用于糜烂渗出明显者. 2.糖皮质激素霜剂及软膏:外用，每日2次，适用于急性浅表性龟头包皮龟头炎，环状糜烂型龟头包皮龟头炎及浆细胞性龟头包皮龟头炎之干燥脱屑

性损害. 3.抗真菌制剂:可选用复方康纳乐霜及皮康霜外用, 每日2次, 适用于念珠菌性龟头包皮炎。(二)系统疗法1. 抗生素: 可选用青霉素、复方新诺明及氟哌酸; 适用于有继发感染者; 2.抗真菌药:可选用伊曲康唑每次0.2克, 每日2次, 连服3天.适用于念珠菌性龟头包皮炎. 3.糖皮质激素:可选用强的松, 每日10~15mg, 每日2次.适用于环状糜烂性龟头包皮炎及浆细胞性龟头包皮炎。(三)手术疗法适用于包茎及包皮过长者所致的龟头包皮炎; 待炎症过后行包皮环切术。

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com