

外阴白色病变_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_A4_96_E9_98_B4_E7_99_BD_E8_c22_610462.htm 外阴白色病变是指外

阴皮肤黏膜营养障碍所致的组织变性及色素减退的疾病。根据组织病理改变又分为增生型营养不良、硬化苔藓型营养不良及混合型营养不良。【诊断】一、本症可发生于任何年龄

。主要症状为外阴瘙痒；当外阴部有糜烂、皲裂和溃疡时可有疼痛；外阴萎缩粘连时，阴道口变窄或因疼痛而发生性交困难。二、妇检可见外阴呈增生型、萎缩型及混合型三种类型，并伴外阴皮肤黏膜色素脱失。

1. 增生型营养不良：主要表现为双侧阴唇沟、小阴唇、阴蒂、后联合等处呈局灶或弥漫性粉红色或白色增厚的斑片，表皮粗糙增厚或有鳞屑。可

并发糜烂、皲裂、溃疡。2. 硬化苔藓型：病变常累及阴蒂包皮、小阴唇、后联合及肛周。皮肤黏膜变白、变薄，失去弹性，干燥易皲裂。阴蒂常萎缩与包皮粘连，小阴唇萎缩，阴

道口也可挛缩、狭窄。3. 混合型：增厚与萎缩的病变可同时存在。三、最后确诊要依靠病理检查。活检应在有皲裂、溃

疡、隆起、硬结或粗糙处取材，并注意多点取材，以发现非典型增生及癌变。为取材适当，可先用1%甲苯胺蓝染色，再用1%醋酸脱色，在不脱色区进行活检。【治疗】1. 一般性治

疗：经常保持外阴部皮肤清洁干燥，内裤宽大，以棉织品为宜。外阴忌用碱性肥皂和刺激性药物擦洗，也不用热水洗烫。不吃辛辣刺激性食物，劳逸结合，避免过度紧张。外阴局

部避免搔抓。2. 中药口服并配合维生素、脱敏、镇静的西药治疗。3. 激光、微波、光热疗法及穴位封闭治疗。4. 外阴局

部用药。(1)洗剂可用3%硼酸溶液或中药薰洗。(2)对增生型病变，可用醋酸去炎松尿素霜、复方尿素霜(尿素霜、肤轻松、雌激素),1%氢化可的松软膏等局部涂擦。或用皮质类固醇激素局部注射。(3)对萎缩型病变，可选用2%丙酸睾酮鱼肝油软膏(丙酸睾酮200mg加入20%鱼肝油软膏20g内)，每日涂擦3~4次，或用复方护肤霜(硅霜、鱼肝油、氯霉素、苯佐卡因)、20%鱼肝油软膏、竹红菌素软膏。对混合型病变，可用以上药物交替使用。(4)有皲裂及溃疡者。可用3%硼酸溶液外洗，合并感染者可用1%利凡诺尔溶液外敷。局部涂以养阴生肌散、樟丹蛤粉等量油调后外用、或应用女阴溃疡膏。也可局部应用激光治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com