

日光性角化病\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E6\\_97\\_A5\\_E5\\_85\\_89\\_E6\\_80\\_A7\\_E8\\_c22\\_610466.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_97_A5_E5_85_89_E6_80_A7_E8_c22_610466.htm) 日光性角化病又称光线性角化病或老年角化病；是一种皮肤长期遭受日光照射后而引起的癌前期病变；本病多见于中老年人，好发于暴光部位，部分损害可发展成鳞癌。【诊断】一、病史（一）中老年人多见；（二）常发生于户外工作者，尤其是农民、渔民、登山队员及地质勘探工作者；（三）好发于暴光部位；（四）一般无自觉症状，有时有轻度瘙痒或疼痛；（五）病程慢，预后尚好。二、体征（一）皮疹多见于颧部、颊侧、下唇、耳轮、手背及前臂伸侧；（二）早期损害为鳞屑性红斑或淡红色扁平丘疹，表面常有少数毛细血管扩张，并附有黄色或褐色粘着性鳞屑；（三）后期损害颜色较深，呈黄褐色或黑褐色，表面干燥，角化明显，有紧附于基底的硬痂，不易剥除，强行剥除会有轻微出血；（四）常有皮肤萎缩及色素沉着；（五）少数病例可见疣状增生、皮角、糜烂、溃疡及鳞癌。三、组织病理病变表皮与周围正常表皮界限分明；可表现为表皮轻至中度乳头瘤样增生，棘层肥厚、细胞排列紊乱，可见不典型及角化不良细胞，核分裂象多见而不典型；也可呈全层表皮萎缩，角化过度，表皮突消失，不典型细胞主要见于基底层，核大而深染，可向真皮内呈芽状或短管状增生；在不典型细胞组成的基底细胞层上面，有时可见棘层松解及角化不良细胞；有时不典型的角化细胞内充满色素或色素阻滞，真皮浅层见较多的噬色素细胞；严重者表皮各层失去正常形态，类似原位癌。四、鉴别诊断需与盘状红斑

狼疮、脂溢性角化病及皮肤原位癌鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）早期损害可局部外用抗肿瘤药物，并注意避光；（二）顽固性损害可用激光、冷冻及手术治疗。二、治疗方法（一）局部疗法1.5% 二氧化钛软膏：外用，每日2次；2.5%5-氟尿嘧啶软膏：外用，每日1次；3.20%足叶草脂溶液：外用，每日1次，连用3天。（二）物理疗法1.二氧化碳激光疗法；2.液氮冷冻疗法。（三）手术切除效果较好。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)