

多发性皮脂囊瘤_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_A4_9A_E5_8F_91_E6_80_A7_E7_c22_610472.htm

多发性脂囊瘤是一种良性皮肤肿瘤，属错构瘤；多呈常染色体显性遗传；临床上以胸腹中部出现多发性中央有紫蓝色小点的囊肿为特征。【诊断】一、病史（一）任何年龄均可发病，青少年男性多见；（二）可有家族史；（三）一般无自觉症状，继发感染时会痛；（四）病程慢，可多年保持不变，偶可自行吸收消退。二、体征（一）多见于胸腹中部，也可见于头面部、颈部、腋窝、躯干、四肢及阴部；（二）囊肿多发，直径2~10mm，可高出皮面，用手绷紧患处皮肤更明显；大的囊肿中央可见紫蓝色小点。三、组织病理囊肿位于真皮内，囊壁由复层鳞状上皮组成，厚薄不一，可有折叠；囊壁内面为角质层，无颗粒层；囊内含大量皮脂及少许角质细胞，偶见毛发；囊壁及邻近部位可见小而扁平的皮脂腺小叶。四、鉴别诊断本病需与粟丘疹、表皮囊肿及皮样囊肿鉴别。【治疗】手术切除或电解治疗。

第五节 脂溢性角化病脂溢性角化病又称老年疣，基底细胞乳头瘤，是一种角质形成细胞成熟迟缓所致的良性表皮内肿瘤。【诊断】一、病史（一）多见于中老年人；（二）男性比女性多见；（三）一般无自觉症状；（四）病程慢，个别病例有自愈倾向；（五）皮损突然发生且迅速增多并有瘙痒者，可伴发内脏肿瘤。二、体征（一）多见于头面部、颈部、腋窝、躯干及双上肢，偶见于下肢；（二）早期损害为棕褐色或褐色扁平丘疹或斑片，以后皮疹逐渐增大形成斑块或乳头瘤样损害，上覆一层油腻性厚

痂，质软而脆；颈部及腋窝部损害表现为丝状乳头瘤样外观；（三）皮损多发，外形规则，可有毛囊角栓。三、组织病理病理表现多样，其共同特点是角化过度，棘层肥厚和乳头瘤样增生；常可见到假性角囊肿；损害下界平坦，与两侧正常表皮处于同一平面上；根据病理特征，病理上可分为角化过度型、腺样型、棘层肥厚型、克隆型及激惹型等几种类型。四、鉴别诊断需与日光性角化病、色素痣、汗管瘤、扁平疣及色素性基底细胞癌鉴别。【治疗】一、治疗原则一般不需治疗，必要时对症治疗，去除损害。二、治疗方法（一）局部疗法1.3%氢醌霜：外用，每日2次，适用于早期损害；2.2%5-氟尿嘧啶软膏：外用，每1次，适用于面部以外的损害；3.0.1%维甲酸霜：外用，每日2次；4.维生素e霜：外用，每日2次。（二）物理疗法1.冷冻疗法：适用于多发性损害；2.电干燥疗法；3.二氧化碳激光疗法。（三）手术疗法适用于可疑恶变的损害。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com