

皮样囊肿_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_9A_AE_E6_A0_B7_E5_9B_8A_E8_c22_610473.htm 10岁以下多见，偶见于成人。常发生于眼肌圆锥外，多附于眶内上或中上壁，可为哑铃状，颅内、眶内各有一部分。【诊断】1.好发于眼睑、眉外侧、鼻根、枕部等处。囊肿呈圆形，柔软无痛，与皮肤无粘连，但与深部的筋膜或骨粘连，不易推动。2.内容物呈粥样，浓稠，含有脱落的上皮细胞、皮脂或毛发等。【治疗措施】手术切除。切除眼角部位的皮样囊肿时应注意有时囊肿与硬脑膜相连。如误伤硬膜而未及时处理，则可形成脑脊液漏。【临床表现】眼球前下突出，不能复位，无搏动，无眼痛，视力多正常。【辅助检查】1.b超表现：眶内混杂回声圆形或椭圆形占位，边界清楚，可见强回声光团，透声性强，可压缩。2.ct表现：肿物密度不均，可有脂肪密度区，相邻骨壁可凹陷或缺损。眶腔扩大少见。3.mri表现：肿物t1与t2加权像均为高信号强度。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com