

??_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022_____E7_9A_AE_E8_82_A4_E6_c22_610474.htm 皮赘又称软纤维瘤，是皮肤结缔组织增生而成的一种带蒂的良性肿瘤；根据临床表现，可将之分为多发性皮赘及孤立性皮赘两种。【诊断】一、病史（一）多发生于中老年人；（二）女性多见；（三）无自觉症状，或有轻度瘙痒。二、体征（一）多发性皮赘1.多见于颈侧及腋窝；2.表现为绿豆或米粒大有沟纹的软丘疹或丝状突起；3.皮损多发，常有数十个。（二）孤立性皮赘1.多见于面部、躯干下部及腹股沟；2.损害单发、质软、有蒂、呈息肉样突起。三、组织病理皮损主要由疏松结缔组织、纤维细胞、胶原纤维、成熟的脂肪细胞或扩张的毛细血管组成。多发性皮赘表现为表皮乳头瘤样增生、角化过度、棘层肥厚，可见角囊肿；孤立性皮赘表皮可萎缩，也可呈乳头瘤样增生，棘层轻度至中度肥厚；表皮萎缩者真皮内含大量成熟的脂肪细胞；表皮增生者真皮内常见扩张的毛细血管、腔内充满红细胞。四、鉴别诊断需与丝状疣鉴别。【治疗】一、治疗原则对症治疗。二、治疗方法（一）30%三氯醋酸：外涂于皮损之上，以发白为度，一次即可；（二）液氮冷冻疗法；（三）二氧化碳激光疗法；（四）电凝固法；（五）刮除法。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com