

非淋菌性尿道炎\_宫颈炎\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_B7\\_8B\\_E8\\_8F\\_8C\\_E6\\_c22\\_610496.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_9D_9E_E6_B7_8B_E8_8F_8C_E6_c22_610496.htm) 非淋菌性尿道炎是指

除了淋球菌以外的多种病原体引起的尿道炎。其主要病原体为沙眼衣原体及支原体，少见病原体包括阴道毛滴虫、白念珠菌及单纯疱疹病毒等。该病好发于青年人，男性多见；主要通过性接触传播。临床上以排尿不适或灼痛、尿道分泌物稀少为特征；女性病例除了尿道炎外，还可表现为外阴阴道炎及子宫颈炎等，称为粘液脓性宫颈炎（mpc）。该病反复发作，迁延难愈。

【诊断】一、病史（一）常有婚外性生活史，以前患有淋病史或配偶患非淋菌性尿道炎史；（二）自觉尿道瘙痒或灼痛、尿频、轻度排尿困难；（三）病情时轻时重；（四）男性患者晨起尿道口有少量粘液性或粘液脓性分泌物；（五）女性患者可有白带增多或下腹不适。

二、体征（一）男性尿道口红肿，严重衣原体感染者尿道口呈唇样外观；（二）女性阴道分泌物增多，衣原体感染者宫颈充血明显，脆性增加，容易出血，可有轻度糜烂；（三）男性主要并发症为附睾炎及前列腺炎，女性主要并发症为急性输卵管炎。

三、实验室检查（一）晨尿沉淀高倍镜下每个视野多形核白细胞15个及以上；（二）男性尿道分泌物涂片油镜下平均每视野见到5个及以上多形核白细胞，女性宫颈粘液脓性分泌物涂片油镜下平均每视野见到10个以上多形核白细胞有诊断意义。

【治疗】一、治疗原则（一）早期诊断，及时、足量、规则治疗；（二）不同的病情采用不同的治疗方案；（三）性伴应同时治疗；（四）注意耐药菌株感染的可能

，采用敏感有效的药物；（五）治疗一周后病情未改善应改用其他治疗方案。二、治疗方案：可选择以下方案之一治疗。（一）强力霉素：每次口服0.1克，每日2次，连服7~10天。（二）红霉素：每次口服0.5克，每日4次，连服至少7天。（三）阿奇霉素：一次性口服1.0克。（四）美满霉素：每次口服0.1克，每日2次，连服10天。（五）氟嗉酸：每次口服0.2克，每日2次，连服至少7天。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)