

高渗性脱水_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_AB_98_E6_B8_97_E6_80_A7_E8_c22_610507.htm 体内水的丢失多于钠的丢失，体液呈高渗状态，称为高渗性脱水。【诊断】1.病史 各种原因引起水分摄入不足或水分丧失过多。2.临床表现以细胞内脱水症状(口渴)为主，临床分为三度。 轻度。口渴、尿少。失水量约为体重的2%~4%(简记为3%)。 中度。口烦渴和唾液少、汗少、尿少、尿比重高。失水量约为体重的5%~6%(简记为6%)。 重度。除上述症状外，可出现幻觉、狂躁甚至昏迷。失水量达体重7%以上(简记为9%)。3.辅助检查 血清钠 $>150\text{mmol/l}$ 。 尿量少，尿比重高。 血液浓缩。血红蛋白、红细胞计数及比容增高，红细胞平均体积缩小。【治疗】主要补充水分，不能口服者静脉滴注5%葡萄糖溶液。补充量： 根据轻、中、重度估计补充量。 根据血清钠浓度计算：补充水量(ml)=血清钠浓度上升值(mmol/l)×体重(kg)×4(注：女性为3，婴儿为5)一般当日只补充上述估计量的1/2,以免发生水中毒。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com