

高钾血症_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_AB_98_E9_92_BE_E8_A1_80_E7_c22_610513.htm 血清钾浓度高

于5.5mmol/l，称为高钾血症。【诊断】1.病史有下述情况之一：挤压伤、大面积烧伤，组织细胞严重破坏。严重溶血反应。急性肾功能衰竭。输入大量库血。2.临床表现轻度增高。手足及口周麻木和感觉异常，肌肉酸痛。严重增高(gt.5.5mmol/l。心电图检查，早期出现t波高耸，q-t间期延长.晚期r波降低，s波加深而st段下降，qrs波群增宽等。

【治疗】立即停止钾的摄入，积极采取保护心脏的急救措施，对抗钾对心肌的毒性作用，促使钾向细胞内转移。具体措施可采取：10%葡萄糖酸钙液10ml~20ml静注，必要时重复。

立即静注11.2%乳酸钠溶液40ml~60ml.或5%碳酸氢钠液90ml~100ml，之后再静滴乳酸钠液60ml~100ml.或5%碳酸氢钠液100ml~200ml。20%~50%葡萄糖液100ml~200ml，加胰岛素(4克糖加1u正规胰岛素)作静滴。注射阿托品对抗心脏传导阻滞。进行性血钾增高者，需考虑腹膜透析或血液透析。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com