

蜂螫伤\_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E8\\_9C\\_82\\_E8\\_9E\\_AB\\_E4\\_BC\\_A4\\_\\_c22\\_610544.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_9C_82_E8_9E_AB_E4_BC_A4__c22_610544.htm) 蜂毒之主要成分为蚁酸，也含有作用于神经系统的毒素。【诊断】1. 局部表现 螫伤部位红肿，中央可见小黑点，多为刺伤点或毒刺存留部位，周围可有丹毒或荨麻疹样改变。2. 全身症状 一般不甚明显，但被群蜂多处螫伤时症状较重。可出现头晕、头痛、寒战、发热、气喘、心率增快、血压下降甚至休克、昏迷等。【治疗】1. 螫伤后立即设法拔除毒刺。局部可用肥皂水、10%氨水或5%小苏打水冲洗。2. 伤口周围外敷南通蛇药。3. 用0.25%~0.5%普鲁卡因行伤口周围封闭。4. 重症者住院治疗，依病情使用抗组胺药物。变态反应明显者，可使用肾上腺素或10%葡萄糖酸钙等。5. 适当使用止痛、镇静剂。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)