

胸腺咽管囊肿及瘻管_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E8_83_B8_E8_85_BA_E5_92_BD_E7_c22_610553.htm

胎儿发育至3周时，在原始咽的两侧发生胸腺咽管，下行至颈胸部，其下部发生胸腺，其余部分逐渐退化。如果退化不全，则成为胸腺咽管囊肿的起源。【诊断】1.在下颌角与胸骨切迹间，胸锁乳突肌前缘中1/3处囊性包块，大小约1cm~5cm，球形、无痛、柔软、波动感，穿刺可得清亮液体。基底活动度受限。并发感染时，可出现迷走神经压迫症状。2.胸腺咽管囊肿形成的瘻管可分为三种。不完全外瘻。仅有外口。不完全内瘻。仅有咽部内口。完全瘻。兼有内口及外口。管道的任何部位均可发生囊肿，可单独存在或合并瘻管。如为外瘻管，其口甚小，可有少量粘液间歇排出。【治疗】手术摘除。单纯囊肿且无感染者，手术必须将囊肿或瘻管全部切除。有瘻管尤其是有内口的管道，因沿颈动脉上行，需较大的切口和细致的解剖，摘除需达内口端再予缝扎。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com