

乳腺结核\_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B9\\_B3\\_E8\\_85\\_BA\\_E7\\_BB\\_93\\_E6\\_c22\\_610558.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E4_B9_B3_E8_85_BA_E7_BB_93_E6_c22_610558.htm) 乳房结核多继发于肺结核、肠结核或肠系膜淋巴结结核，经血行传播至乳房。临床较少见。【诊断】1. 多发生于20~40岁妇女，病程缓慢。2. 初期局限于乳房一处，呈单一或数个结节状肿块，不痛，边界不清，可与皮肤粘连，肿块液化形成寒性脓肿，破溃后形成一个或数个窦道或溃疡，分泌物稀薄，伴豆渣样物。溃疡边缘皮肤呈潜行性，分泌物涂片染色偶可找到抗酸菌。3. 患侧腋窝淋巴结可肿大。4. 可伴有低热、盗汗、血沉快。【治疗】1. 增加营养、注意休息。2. 全身抗结核治疗。3. 病变局限一处者，可做病灶切除；范围大者，可做单纯乳房切除；患侧淋巴结肿大者，可一并切除。4. 有原发灶患者，在手术后仍需继续抗结核治疗。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)